

Factores relacionados a la consulta tardía en personas con síndrome coronario agudo en centros asistenciales de la provincia del Biobío

Gissella Lagos Rifo^{1,2*}, Patricia Cid Henríquez³.

1. Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 2. Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruíz, Los Angeles, Chile.
3. Universidad de Concepción. Concepción, Chile.

*Correspondencia: gissella.lagos@gmail.com

Objetivo: Analizar los factores biológicos, sociales, demográficos y psicológicos que influyen en que las personas consulten tardíamente por un síndrome coronario agudo en la provincia del Biobío. **Metodología:** Estudio cuantitativo, transversal, descriptivo y correlacional, participaron 48 personas hospitalizadas en el Hospital de Los Ángeles, con diagnóstico de síndrome coronario agudo, entre los meses de diciembre 2020 y abril 2021, quienes respondieron el instrumento compuesto por un cuestionario semiestructurado de datos biosociodemográficos y psicológicos, y la escala de interpretación de síntomas. **Resultados:** Un 60,4% de las personas consultaron tardíamente, con una mediana de 4,5 horas desde el inicio de los síntomas a la llegada a un centro asistencial. El perfil de la muestra estuvo compuesta mayoritariamente por hombres entre 51 a 70 años, al menos con una enfermedad crónica, enseñanza básica incompleta y con acceso a centro de salud cercanos su domicilio. Si bien las personas identificaron sus síntomas como de origen cardíaco, lo valoraron como insignificante, esperando que se aliviaran por sí solos. **Conclusiones:** El retraso en la consulta se debe principalmente a la decisión por parte de las personas de acudir a un centro de salud tras iniciado los síntomas.

Palabras clave: Atención de enfermería, Síndrome coronario agudo, Síntomas, Tiempo de tratamiento.